
Aambeien(hemorrhoiden)

zie ook [folder](#)




[english version](#)

animatie

Voor de behandeling van aambeien zijn meerdere technieken mogelijk zoals in de [folder](#) beschreven staat. In het onderstaande voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de sclerotherapie. Hierbij wordt een vloeistof in de aambeï gespoten die ervoor zorgt draagt dat de aambeï gaat verschrompelen en verdwijnt. Het is een behandeling die vaak in een aantal keren wordt gegeven met een tussentijd van enkele weken. Soms moet na verloop van tijd de behandeling herhaald worden. Het is over het algemeen een weinig belastende ingreep die binnen enkele minuten klaar is. Na afloop kan iets bloedverlies optreden, doordat in de aambeï geprikt is.



Voor een optimaal zicht wordt gebruik gemaakt van een koud licht bron (1). Deze wordt met een kabel verbonden met de proctoscoop (2). Deze bestaat uit twee delen: een binnenste compact deel dat taps toeloopt en gebruikt wordt voor het makkelijk inbrengen van het buitenste holle deel. Vaseline wordt op de proctoscoop aangebracht om het inbrengen nog verder te vergemakkelijken (3). Hierna wordt de lichtkabel aangesloten op de proctoscoop.



Het inbrengen van de proctoscoop gebeurt hier in zijligging, maar het kan ook in knie/elleboog ligging of in rugligging met opgetrokken benen. Na het verwijderen van het binnenste deel van de proctoscoop kan in de laatste 12-15cm van de endeldarm gekeken worden. Als er aambeien aanwezig zijn zoals op afbeelding 7, kan vervolgens overgegaan worden tot het inspuiten (scleroseren) zoals op afbeelding 8. Omdat na het inspuiten zwelling ontstaat en een (bedoelde) ontstekingsreactie, wordt bij voorkeur één

aambeï behandeld en niet meer. Door meer aambeien tegelijk te behandelen zou teveel ontstekingsreactie kunnen ontstaan met teveel kans op napijn.

terug / entree
