
Abces oksel




[english version](#)


Een abces ontstaat door een uit de hand gelopen infectie in de weke delen waarbij de natuurlijke afweer van het lichaam niet in staat is om de binnengedrongen bacteriën afdoende te bestrijden. Als zich eenmaal een abces gevormd heeft helpen antibiotica ook niet meer en dient chirurgisch te worden ingegrepen:

'ibi pus, ibi evacua' - oftewel: waar pus is dient dit verwijderd te worden

animatie



In dit voorbeeld is sprake van een abces in de oksel, waarbij meestal een ontsteking van de zweetklieren oorzakelijk is. In dit geval gaat het om een ontstoken talgklier, eveneens vaak oorzakelijk. Op foto 1 is het abces zichtbaar met daaromheen een groot gebied van ontsteking als reactie. Het abces wordt geopend met het mes (2) waarop de romige pus ontwijkt (3). Om het abces heen zijn ook lymfklieren ontstoken en de grootste wordt ook geopend (4). De twee holtes staan met elkaar in verbinding (5).



Om te voorkomen dat de wonden te snel verkleven met achterlating van pus wordt een drain achtergelaten door de twee openingen. Hierna wordt verband aangelegd. Na de operatie dient de wond dagelijks twee tot drie maal te worden gespoeld met water / douche. Als het vocht uit de wond schoon blijft kan de drain worden verwijderd (meestal na ongeveer 3-4 dagen) en zal de wond binnen twee tot drie weken genezen.

terug / entree
