

Condylomata acuminata (genitale wratten)

Genitale wratten komen voor in de bilspleet of in de anus. Bij vrouwen komen ze rond of in de vagina en de baarmoedermond voor. Bij mannen op en rond de penis. Genitale wratten kunnen ook via orale seks in de mond terechtkomen.

Genitale wratten doen geen pijn, maar kunnen jeuken. Ze worden veroorzaakt door het Humaan Papilloma virus. Dit virus wordt overgebracht via seksueel contact.

De aandoening is dus een SOA (sexueel overdraagbare aandoening) en na chlamydia de meest voorkomende.

De behandeling kan onder andere chirurgisch plaats vinden door het wegbranden van de wratten. Hiervan is in het onderstaande een voorbeeld gegeven bij de anus.



Bij 1, 1a en 2 zijn de wratten te zien, waarbij er enkele kleine zijn en een veel grotere. Met name deze grote is reden om chirurgisch te behandelen. Kleine wratten kunnen ook worden aangestipt met medicijnen (podofylline). Bij 3-5 is te zien hoe de wratten worden weggehaald en 6 toont de situatie na afloop. Er blijven open wondjes over die binnen een tot enkele weken geheel zullen genezen. De ingreep kan onder verdoving via een ruggeprik of algehele narcose plaats vinden. Zolang de wondjes open zijn zal er vochtverlies optreden. Dit is normaal. Dagelijks douchen en spoelen na ontlasting is afdoende.

voor meer informatie en links zie www.gezondheidsplein.nl

[terug](#) / [entree](#)
