
Haarnestcyste

(sinus pilonidalis)

zie [folder](#)



[english version](#)

Een haarnestcyste is een pijpzweer die wordt veroorzaakt door ingroeiende haren. Meestal komt hij voor in de bilspleet. Kenmerkend is het steeds terugkeren van de ontstekingen, pijn, zwelling en doorbreken met pusproductie. Het behandelen kan door het hele fistelgebied ruim weg te snijden (zoals in onderstaand voorbeeld) of het behandelen met een etsende vloeistof die in de gangetjes gespoten wordt waardoor ze verschrompelen (voor de kleinere fistels, zie [hier](#)).



Het gebruikte instrumentarium is eenvoudig en bestaat o.a. uit een sonde om te bepalen hoe diep de fistelgang is (1-4). Soms wordt een blauwe kleurstof ingespoten om de uitbreiding te kunnen zien (5).



Met behulp van een elektrisch mes, om het bloeden zo veel mogelijk te beperken, wordt het hele gebied ruim weggehaald(6,7,8)



Hierna blijft een relatief groot defect over (8). Dit kan worden gesloten, zoals in dit voorbeeld, maar het kan ook gedeeltelijk worden opengelaten. Dat wordt dan gedaan omdat het infectierisico in dit gebied groot is (9-11).

[terug](#) / [entree](#)