
laparoscopische cholecystectomie

= galblaasverwijdering via kijkoperatie

zie [folder](#)



[english version](#)

[video](#)




De chirurg opereert via een viertal kleine (0,5 - 1cm) openingen en kijkt hierbij op de televisie monitor naar zijn handelingen in de buik



De galblaas wordt met tangetjes beetgepakt en eventuele vergroeiingen worden losgemaakt. Vervolgens wordt een soort nietjes met een tang op de afvoergang van de galblaas en op de slagader geplaatst.



Tussen de nietjes worden de galgang en de slagader die naar de galblaas loopt doorgeknipt.



Hierna wordt de galblaas losgemaakt van de lever. Dit gebeurt met een haakje dat het weefsel losbrandt zodat er geen bloeding optreedt.



Nadat de galblaas helemaal is losgemaakt kan hij rechtstreeks via de navel uit de buik worden verwijderd of nadat hij in een plastic opvangreservoir is geplaatst zoals in dit voorbeeld.



Het plastic reservoir steekt uit de buik bij de navel en hieruit wordt de galblaas verwijderd. Na openen van de galblaas blijken er een tweetal grote en een aantal kleinere steentjes aanwezig te zijn.

De operatie via de kijkmethode lukt in ongeveer 95-98% van de gevallen. Bij de operatie wordt CO2 gas in de buik geblazen om goed zicht en werkruimte te hebben. Hierdoor kan het voorkomen dat na de ingreep schouderpijn optreedt door irritatie van het gas bij het middenrif. Dit is voorbijgaand. Als het niet lukt om de ingreep via de kijkoperatie te voltooien, wordt tijdens dezelfde narcose de galblaas via een grotere snee onder de rechter ribbenboog verwijderd. Na een geslaagde kijkoperatie kan de patient meestal de dag na de ingreep de kliniek weer verlaten.

[terug](#) / [entree](#)
